PROPALIN

Actif contre: L´incontinence urinaire associée à une incompétence du sphincter urétral chez la chienne

Composition

Phénylpropanolamine
(sous forme de chlorhydrate) ..... 40,28 mg (Soit Chlorhydrate de Phénylpropanolamine 50 mg)
Excipient ..... qsp 1ml

Propriétés

Propriétés pharmacologiques
Brève présentation du principe actif : Le chlorhydrate de phénylpropanolamine est un agent sympathomimétique. C´est un analogue des amines endogènes sympathomimétiques.
ATC Vetcode : QG04BX91

Propriétés pharmacodynamiques
L'effet clinique de la phénylpropanolamine dans le traitement de l'incontinence urinaire est fondé sur son action stimulante de certains récepteurs a-adrénergiques ce qui provoque une augmentation et une stabilisation du tonus de l'urètre, principalement innervé par des nerfs adrénergiques. La phénylpropanolamine est un mélange racémique d'énantiomères L et D.

Propriétés pharmacocinétiques
Chez le chien, la concentration plasmatique maximale de phénylpropanolamine est atteinte en 1 heure environ et la demi-vie est approximativement de 3 heures. Aucune accumulation n'a été observée après administration d'une dose de 1 mg/kg, 3 fois par jour pendant 15 jours. Lorsque le produit est administré à jeun, sa biodisponibilité augmente significativement.

Indications

Traitement de l´incontinence urinaire associée à une insuffisance du sphincter urétral chez la chienne.
L'efficacité a été démontrée chez les chiennes ovariohystérectomisées.

Administration et posologie

La dose recommandée de Propalin est de 1 mg/kg de poids corporel trois fois par jour dans la nourriture, ce qui correspond à 0,1 ml de Propalin pour 5 kg de poids corporel, 3 fois par jour ou une goutte de Propalin pour 2 kg de poids corporel, 3 fois par jour en utilisant le compte goutte.
L'absorption augmente si le produit est administré à jeun.

Surdosage (symptômes, conduite d´urgence, antidotes)

Chez les chiens en bonne santé, aucun effet secondaire n'a été observé à 5 fois la dose recommandée. Cependant, il est probable qu´un surdosage en phénylpropanolamine puisse entraîner des symptômes de stimulation intense du système nerveux sympathique. Le traitement doit être symptomatique. Des antagonistes a-adrénergiques peuvent être appropriés en cas de surdosage important. Cependant, il n'est pas possible de recommander spécifiquement un antidote ou une posologie.

Précautions d'emploi

La phénylpropanolamine, en tant qu'agent sympathomimétique, peut affecter le système cardiovasculaire, particulièrement la pression sanguine et le rythme cardiaque et doit être utilisée avec précaution chez les chiens souffrant de pathologies cardiovasculaires. Un soin particulier doit être apporté lors du traitement des animaux présentant une insuffisance rénale ou hépatique sévère, un diabète sucré, de l'hyperadrénocorticisme , un glaucome, de l'hyperthyroïdie ou d'autres désordres métaboliques.
Chez les chiennes de moins de 1 an, la possibilité d'une incontinence liée à une anomalie anatomique doit être évaluée préalablement au traitement.

Utilisation en cas de gravidité et de lactation

Ne pas administrer aux chiennes en gestation ou en lactation.

Précautions pour la personne qui administre le produit

La phénylpropanolamine chlorhydrate est toxique par ingestion à forte dose. Les effets indésirables se traduisent par des vertiges, des maux de tête, ou des nausée, de l'insomnie ou de la nervosité et une hypertension. Un surdosage important peut être fatal, particulièrement chez les enfants. Pour éviter toute ingestion accidentelle, conserver ce produit hors de portée des enfants. Toujours replacer le bouchon de sécurité après utilisation. En cas d'ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin et lui montrer la notice ou l´étiquette. En cas de contact accidentel avec la peau, laver la zone souillée à l´eau et au savon. Se laver les mains après utilisation du produit.
En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer à l´eau pendant 15 minutes environ et consulter un médecin.

Contre-indication

L'utilisation de Propalin n'est pas indiqué dans le traitement des troubles de la miction d'origine comportementale. Ne pas administrer chez les animaux traités avec des inhibiteurs non sélectifs de la mono-amine oxidase.

Effets indésirables

Au cours des essais cliniques, des selles molles, des diarrhées liquides, une diminution de l'appétit, des arythmies et des syncopes ont été rapportés chez certains chiens. Le traitement peut être poursuivi en tenant compte de l'importance des effets indésirables observés.
Les sympathomimétiques peuvent avoir de nombreux effets, la plupart d´entre eux simulant une stimulation intense du système nerveux sympathique (par exemple : effets sur le rythme cardiaque et la pression sanguine).

Interaction

L'administration concomitante de Propalin avec d'autres agents sympathomimétiques, d'anticholinergiques, d'antidépresseurs tricycliques ou d'inhibiteurs spécifiques de type B de la mono-amine oxidase doit se faire avec précaution. Le produit ne doit pas être utilisé chez les animaux traités avec des inhibiteurs non sélectifs de la mono-amine oxidase.

Catégorie

LISTE I – USAGE VETERINAIRE – A NE DELIVRER QUE SUR ORDONNANCE

Conservation

Ne pas conserver à une température supérieure à 25°C. Ne pas conserver au réfrigérateur.

Présentation

Boîte de 1 flacon de 30 ml et de 1 seringue graduée de 1,5 ml : 678302 6
Boite de 1 flacon de 100 ml et de 1 seringue graduée de 1,5 ml : 678012 8

Nom et adresse du titulaire de l´Autorisation de Mise sur le Marché

VETOQUINOL S.A
MAGNY VERNOIS
70200 LURE

Précautions particulières à prendre lors de l´élimination de produits non utilisés ou de déchets

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies selon la réglementation sur les déchets.